

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Dioxaflex Protect

Diclofenac Sódico 75 mg

Omeprazol 10 mg

Cápsulas Duras

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA



Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

Contenido de la información para el paciente

1. QUÉ ES DIOXAFLEX PROTECT Y PARA QUÉ SE UTILIZA

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR DIOXAFLEX PROTECT

3. CÓMO USAR DIOXAFLEX PROTECT

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

5. CONSERVACIÓN DE DIOXAFLEX PROTECT

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

1. QUÉ ES DIOXAFLEX PROTECT Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Dioxaflex Protect es un medicamento que combina dos principios activos: Diclofenac Sódico y Omeprazol.

Diclofenac Sódico pertenece al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINE), utilizados para tratar el dolor y la inflamación. Omeprazol pertenece a un grupo de medicamentos denominados “inhibidores de la bomba de protones”. Estos medicamentos actúan reduciendo la cantidad de ácido producida por el estómago.

Dioxaflex Protect se utiliza para tratar el dolor y la inflamación en caso de artritis, artrosis o cualquier otra patología que se manifieste con inflamación aguda o crónica (inflamación en las partes blandas adyacentes a las articulaciones, dolor agudo de una enfermedad llamada gota, inflamaciones y tumefacciones posteriores a un traumatismo, dolores menstruales) en aquellos pacientes que presenten riesgo de desarrollar lesiones en el estómago o intestino secundarias al uso de un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE), como lo es Diclofenac.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR DIOXAFLEX PROTECT

Es importante que utilice la menor dosis que alivie o controle el dolor y no debe tomar este medicamento más tiempo del necesario para controlar sus síntomas.

IF-2023-27631139-APN-DERM#ANMAT

1

No tome Dioxaflex Protect si:

- es alérgico (hipersensible) al Diclofenac, al Omeprazol o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- es alérgico o ha tenido reacciones alérgicas al ácido acetilsalicílico u otros analgésicos (medicamentos para tratar el dolor) similares. Las reacciones pueden incluir asma (dificultad para respirar), dolor en el pecho, urticaria (reacción alérgica en la piel con picazón) rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal) o hinchazón de la cara, los labios, la lengua, la garganta y/o las extremidades (signos de angioedema). Si cree que puede ser alérgico consulte a su médico.
- es alérgico a medicamentos que contengan inhibidores de la bomba de protones (como por ejemplo pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).
- padece actualmente una úlcera o una hemorragia de estómago o duodeno.
- sufre enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa activas (enfermedades que producen diarrea con o sin sangre y dolor abdominal).
- tiene una enfermedad cardíaca establecida y/o una enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, si ha tenido un ataque al corazón, accidente cerebrovascular u obstrucción en los vasos sanguíneos del corazón o del cerebro, o una operación para eliminar alguna obstrucción o hacerle un bypass coronario.
- tiene o ha tenido problemas con la circulación sanguínea (enfermedad arterial periférica).
- se encuentra en el tercer trimestre del embarazo.
- sufre alteraciones en la coagulación de la sangre.
- está tomando un medicamento que contenga nelfinavir (usado para la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana -VIH-).

Tenga especial cuidado con Dioxaflex Protect

Consulte a su médico antes de empezar a tomar **Dioxaflex Protect** o durante el tratamiento:

- si ha tenido o desarrolla una úlcera, hemorragia o perforación en el estómago o en el duodeno pudiéndose manifestar por un dolor abdominal intenso o persistente y/o por heces de color negro o incluso sin síntomas previos de alerta. Este riesgo es mayor cuando se utilizan dosis altas y tratamientos prolongados en pacientes con antecedentes de úlcera péptica y en los ancianos. Asociar un medicamento protector del estómago como el Omeprazol, como es el caso con **Dioxaflex Protect**, disminuye en forma significativa este riesgo.
- si sufre alguna de las siguientes afecciones: asma, enfermedad leve del corazón, enfermedad del hígado o riñón, presión arterial elevada (hipertensión arterial), trastornos hemorrágicos u otros trastornos de la sangre incluyendo porfiria hepática.
- si está tomando medicamentos para la presión o ciclosporina, porque aumenta el riesgo de sufrir daño sobre los riñones.
- si toma simultáneamente medicamentos que alteran la coagulación de la sangre o aumentan el riesgo de úlceras, como anticoagulantes orales o antiagregantes plaquetarios del tipo del ácido acetilsalicílico. También debe comentarle la utilización de otros medicamentos que podrían aumentar el riesgo de dichas hemorragias como otros medicamentos antiinflamatorios, corticoides y antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.
- si padece la enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa pues los medicamentos del tipo de Diclofenac Sódico pueden empeorar estas patologías.
- si tiene la presión arterial alta, niveles elevados de colesterol o de triglicéridos, diabetes o es fumador (factores de riesgo cardiovasculares), su médico deberá reevaluar periódicamente si debe continuar su tratamiento con este medicamento, especialmente si lleva más de 4 semanas de tratamiento.

- si tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal o alteraciones en la sangre, tendrá que realizarse análisis de sangre frecuentes durante su tratamiento. Esto permitirá controlar el funcionamiento de su hígado (nivel de transaminasas) o de sus riñones (nivel de creatinina) o de la sangre (niveles de linfocitos, eritrocitos y plaquetas). Con ello su médico podrá decidir interrumpir o cambiarle la dosis de este medicamento.
- si se ha sometido recientemente o se va a someter a una intervención quirúrgica del estómago o el intestino antes de tomar este medicamento, ya que Diclofenac puede empeorar a veces la cicatrización de las heridas en el intestino después de una intervención quirúrgica.
- si experimenta cualquiera de las siguientes dolencias antes de empezar a tomar **Dioxaflex Protect** o durante el tratamiento consulte inmediatamente a su médico, ya que Omeprazol puede ocultar los síntomas de otras enfermedades: adelgaza mucho sin motivo aparente y tiene problemas para tragar, tiene dolor de estómago o indigestión, empieza a vomitar la comida o a vomitar sangre, sus deposiciones son de color negro (heces teñidas de sangre), presenta diarrea grave o persistente, ya que se ha asociado el Omeprazol a un ligero aumento de diarreas infecciosas, tiene problemas de hígado graves, si alguna vez ha tenido una reacción en la piel después del tratamiento con un medicamento similar a Omeprazol para reducir la acidez del estómago, si sufre una erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico lo antes posible ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento con **Dioxaflex Protect**. Recuerde mencionar cualquier otro síntoma que pueda notar, como dolor en las articulaciones.
- si está tomando algún medicamento que contenga inhibidores de la bomba de protones como Omeprazol, especialmente durante un periodo de más de un año puede aumentar ligeramente el riesgo de fractura de cadera, muñeca y columna vertebral. Informe a su médico si tiene osteoporosis o si está tomando corticosteroides (pueden incrementar el riesgo de osteoporosis).

Pacientes con problemas cardiovasculares

Los medicamentos como Diclofenac se pueden asociar con un aumento del riesgo de sufrir ataques cardíacos (“infarto de miocardio”) o cerebrales (accidente cerebrovascular), especialmente cuando se emplean en dosis altas y en tratamientos prolongados. No exceda la dosis ni la duración del tratamiento recomendado.

Si usted tiene problemas de corazón, antecedentes de ataques cerebrales o piensa que puede tener riesgo de sufrirlos (por ejemplo, tiene la presión arterial alta, sufre diabetes, tiene aumentado el colesterol o los triglicéridos, o es fumador) y su médico decide tratar con este medicamento, no debe tomar más de 75 mg de Diclofenac al día si el tratamiento dura más de 4 semanas.

Asimismo, este tipo de medicamentos pueden producir retención de líquidos, especialmente en pacientes con enfermedad de corazón y/o presión arterial elevada (hipertensión arterial).

En general, es muy importante tomar la dosis eficaz más baja de **Dioxaflex Protect** que le alivie el dolor y/o la inflamación durante el menor tiempo posible para reducir el riesgo de efectos adversos cardiovasculares.

Si nota dolor en el pecho, respiración entrecortada, debilidad o dificultad para hablar mientras está tomando **Dioxaflex Protect**, contacte inmediatamente con su médico.

Uso de Dioxaflex Protect con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta, suplementos dietarios o derivados de hierbas, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos.

Ciertos medicamentos pueden interferir con **Dioxaflex Protect**; en estos casos puede ser necesario cambiar la dosis o interrumpir el tratamiento con alguno de ellos.

No tome **Dioxaflex Protect** si está tomando un medicamento que contenga nelfinavir (usado para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana -VIH-).

Es importante que informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente alguno de los siguientes medicamentos:

- litio o inhibidores de la recaptación de la serotonina (para tratar algunos tipos de depresión),
- ciclosporina, tacrolimus (para después de los trasplantes),
- trimetoprima (para prevenir y tratar enfermedades del tracto urinario),
- medicamentos para tratar problemas del corazón (digoxina, antagonistas del calcio tales como verapamilo o isradipino),
- medicamentos utilizados para tratar la diabetes, excepto la insulina,
- fármacos para controlar la presión arterial (diuréticos, beta-bloqueantes e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina),
- quinolonas o ceftriaxona (para tratar las infecciones),
- otros medicamentos del mismo grupo de Diclofenac (antiinflamatorios no esteroideos), como ácido acetilsalicílico o ibuprofeno,
- corticoides (medicamentos que reducen la inflamación y la acción del sistema inmunitario),
- fenitoína (un medicamento utilizado para tratar los ataques epilépticos),
- misoprostol (para tratar las úlceras de estómago),
- colestiramina y colestipol para disminuir los niveles de colesterol en sangre),
- pentazocina (para aliviar los dolores),
- rifampicina (antibiótico utilizado para tratar infecciones bacterianas),
- ketoconazol, itraconazol, posaconazol o voriconazol (usados para tratar las infecciones por hongos),
- diazepam (usado para tratar la ansiedad, relajar los músculos o en la epilepsia),
- medicamentos empleados para impedir la formación de coágulos de sangre, como warfarina u otros antagonistas de la vitamina K. Su médico tendrá que controlarlo cuando empiece o termine el tratamiento con **Dioxaflex Protect**.
- atazanavir, saquinavir (usados para tratar la infección por VIH),
- hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) (usada para tratar la depresión leve),
- cilostazol (usado para tratar la claudicación intermitente en los miembros inferiores debido a mala circulación de la sangre),
- clopidogrel (usado para prevenir los coágulos de sangre -trombos-),
- erlotinib (usado para tratar el cáncer),
- metotrexato (medicamento de quimioterapia usado en dosis altas para tratar el cáncer). Si está tomando una dosis alta de metotrexato, su médico tendrá que parar temporalmente el tratamiento con **Dioxaflex Protect**.

Uso en niños

No se recomienda el uso de **Dioxaflex Protect** en niños menores de 12 años.

Uso en ancianos

Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles a las lesiones de estómago y duodeno inducidas por AINE que el resto de los adultos, por lo que la asociación con Omeprazol en **Dioxaflex Protect** ejerce un efecto protector frente a tales lesiones en este grupo etario.

Embarazo y lactancia

No se recomienda la administración de **Dioxaflex Protect** durante el primer y segundo trimestre del embarazo salvo que se considere estrictamente necesario.

En el tercer trimestre del embarazo, **Dioxaflex Protect** no debe tomarse.

No deberá tomar **Dioxaflex Protect** si usted está amamantando, o suspender la lactancia si el medicamento es estrictamente necesario para la madre.

Efectos sobre la capacidad para conducir y emplear maquinarias

La influencia de Diclofenac y Omeprazol sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. Sin embargo, los pacientes que experimenten trastornos visuales, mareos, vértigo, somnolencia u otros trastornos del sistema nervioso central, mientras estén en tratamiento con **Dioxaflex Protect** deberán evitar conducir vehículos o utilizar maquinarias.

3. CÓMO USAR DIOXAFLEX PROTECT

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda consulte de nuevo a su médico.

La dosis recomendada es: 1 cápsula de **Dioxaflex Protect** cada 12 horas (desayuno y cena).

Modo de administración

Ingiera las cápsulas enteras, sin masticarlas con una cantidad suficiente de líquido, preferentemente antes de las comidas.

Si toma más Dioxaflex Protect del que debe

Ante la eventualidad de haber tomado una dosis mayor a la que debiera de **Dioxaflex Protect** contacte a su médico, concorra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247;*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115;*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

Si olvidó tomar Dioxaflex Protect

Si olvidó tomar una cápsula no tome una dosis doble de **Dioxaflex Protect** para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **Dioxaflex Protect** puede tener efectos adversos, aunque sólo algunas personas los padecen.

Deje de usar este medicamento y consulte inmediatamente con su médico si advierte:

- cólicos abdominales leves y dolor abdominal a la palpación que comienza poco después de iniciar el tratamiento con este medicamento seguido de sangrado rectal o diarrea con sangre observadas normalmente dentro de las 24 horas posteriores a la aparición del dolor abdominal.
- dolor de pecho, que puede ser un signo de una reacción alérgica potencialmente grave llamada síndrome de Kounis.
- silbidos repentinos al respirar (sibilancias repentinas), hinchazón de los labios, la lengua y la garganta o del cuerpo, erupción en la piel, desmayo o dificultades al tragar (reacción alérgica grave).
- enrojecimiento de la piel con formación de ampollas o descamación. También podrían aparecer ampollas intensas y sangrado en los labios, los ojos, la boca, la nariz y los genitales. Podría tratarse de “síndrome de Stevens-Johnson” o “necrólisis epidérmica tóxica”.
- coloración amarilla de la piel, orina oscura y cansancio, que pueden ser síntomas de problemas del hígado.

Otros efectos adversos que se han notificado con el uso de este medicamento son:

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 pacientes)

- Dolor de cabeza, mareo, vértigo.

- Náuseas, vómitos, diarrea, constipación, sensación de acidez en el estómago, dolor abdominal, flatulencia (gases), falta de apetito, pólipos benignos en el estómago.
- Alteraciones en los resultados de los análisis de sangre sobre el funcionamiento del hígado (aumento de las transaminasas séricas).
- Erupción en la piel.

Efectos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 pacientes)

- Palpitaciones, un fuerte dolor en el pecho repentino (síntomas de infarto de miocardio o de un ataque al corazón), respiración entrecortada, dificultad para respirar estando acostado, hinchazón de pies y piernas (signos de insuficiencia cardíaca). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Trastornos del sueño (insomnio).
- Sensación de hormigueo.
- Somnolencia.
- Habones y picazón de la piel.
- Sensación de malestar general y falta de energía.
- Fractura de muñeca, cadera o columna vertebral.

Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 pacientes)

- Hinchazón en la cara, ojos o lengua, dificultad para tragar, ronchas y picazón generalizada, erupción en la piel, fiebre, calambres abdominales, molestias u opresión en el pecho, dificultad para respirar, mareos, pérdida de la conciencia (reacción alérgica grave). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Somnolencia, dolor de estómago, reflujo del contenido del estómago hacia el esófago, diarrea con sangre.
- Úlcera gástrica o intestinal con o sin sangrado o perforación (vómitos de sangre y aparición de sangre en las heces). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Signos de falta de células de la sangre que produce cansancio, dolor de cabeza, falta de aire al hacer ejercicio, mareos, palidez (por disminución de los glóbulos rojos), infecciones frecuentes con fiebre, escalofríos, dolor de garganta o úlceras en la boca (por disminución de los glóbulos blancos), sangrados o aparición de moretones (por disminución de las plaquetas). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Concentración baja de sodio en la sangre. Puede provocar debilidad, vómitos y calambres.
- Agitación, confusión o depresión.
- Alteraciones del gusto.
- Problemas visuales, como visión borrosa.
- Sensación repentina de respiración dificultosa (broncoespasmo).
- Sequedad de boca, inflamación del interior de la boca.
- Infección denominada “candidiasis” que puede afectar al intestino y que está provocada por un hongo.
- Problemas de hígado, como ictericia, que pueden causar color amarillo de la piel, orina oscura y cansancio.
- Caída del cabello (alopecia).
- Erupción en la piel con la exposición a la luz solar (fotosensibilidad).
- Dolor articular (artralgias) o dolor muscular (mialgias).
- Problemas graves de riñón (nefritis intersticial).
- Aumento de la sudoración.
- Inflamación en el intestino (que provoca diarrea).

Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10000 personas)

- Desorientación, pesadillas, irritabilidad.
- Reacciones psicóticas, ver, sentir u oír cosas que no existen (alucinaciones).
- Trastornos de la memoria, convulsiones, ansiedad, temblor.
- Meningitis (inflamación de las membranas que envuelven al cerebro) con síntomas como fiebre, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, rigidez del cuello o sensibilidad extrema a la luz brillante. Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Accidente cerebrovascular.
- Visión doble.
- Zumbidos en los oídos.
- Hipertensión (presión arterial alta).
- Vasculitis (inflamación de las paredes de los vasos).
- Empeoramiento de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
- Estreñimiento, problemas para tragar (alteración esofágica).
- Dolor intenso en la parte alta del abdomen, náuseas, vómitos y pérdida de apetito (signos de pancreatitis). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Problemas graves de hígado que provocan insuficiencia hepática e inflamación del cerebro.
- Reacciones graves en la piel con erupción, enrojecimiento, ampollas en los labios, boca u ojos, descamación de piel, acompañado de fatiga, náuseas, pérdida de apetito, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, tos o dolor en el cuerpo (síndrome de Stevens Johnson o necrólisis epidérmica tóxica). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Erupción generalizada (eczema), enrojecimiento (eritema y eritema multiforme), descamación de la piel (dermatitis exfoliativa).
- Anomalías del funcionamiento de los riñones que provocan hinchazón en pies o piernas y disminución súbita de la cantidad de orina (insuficiencia renal aguda, nefritis intersticial, necrosis papilar renal), sangre en orina (hematuria), espuma en orina (síndrome nefrótico). Si estos síntomas aparecen, consulte inmediatamente con su médico.
- Debilidad muscular.
- Aumento del tamaño de las mamas en los hombres.

En casos muy raros, el uso de Omeprazol puede afectar a los glóbulos blancos de la sangre y provocar una inmunodeficiencia. Si padece una infección con síntomas como fiebre con un estado general muy deteriorado o fiebre con síntomas de infección local, como dolor de cuello, garganta o boca o dificultades para orinar, deberá consultar a su médico lo antes posible para realizar un análisis de sangre y poder descartar una carencia de glóbulos blancos (agranulocitosis). Es importante que en ese momento proporcione información acerca del medicamento que esté tomando.

Frecuencia desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles)

Si usted está tomando Omeprazol durante más de tres meses es posible que los niveles de magnesio en sangre puedan descender. Los niveles bajos de magnesio pueden causar fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareos, aumento del ritmo cardíaco. Si usted tiene algunos de estos síntomas, acuda al médico inmediatamente. niveles bajos de magnesio también pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre. Su médico puede decidir realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

5. CONSERVACIÓN DE DIOXAFLEX PROTECT

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Los principios activos de **Dioxaflex Protect** son Diclofenac Sódico y Omeprazol.

Cada Cápsula Dura contiene: Diclofenac Sódico 75 mg, Omeprazol 10 mg. Los demás componentes son: Alginato de Sodio, Almidón, Azúcar, Bicarbonato de Sodio, Carbonato de Magnesio, Dióxido de Silicio Coloidal, Dióxido de Titanio, Esferas de Azúcar, Eudragit L 10055 (*), Fosfato Ácido de Sodio, Hidróxido de Sodio, Hidroxipropilcelulosa, Hidroxipropilmetilcelulosa, PEG 6000, Polisorbato 60, Polisorbato 80, Talco.

(*) Eudragit L 10055 está compuesto por: Copolímero del Ácido Metacrílico.

Aspecto del producto y contenido del envase

Envases conteniendo 10, 14, 20, 28, 30 y 40 Cápsulas oblongas, color rojo (tapa) y amarillo (cuerpo).

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **DIOXAFLEX PROTECT** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / infoproducto@bago.com.ar.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 55.784
Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda
CUIL 27177154259
IF-2023-27631139-APN-DERM#ANMAT

8

