INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Segumax 2,5 - 5
Apixabán 2,5 - 5 mg

Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA

Este Medicamento es Libre de Gluten.

Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene informacion importantes para usted.
- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

Contenido de la información para el paciente

1. QUÉ ES SEGUMAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA.
2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR SEGUMAX
3. COMO USAR SEGUMAX.
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACION DE SEGUMAX.
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

1. QUÉ ES SEGUMAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Segumax contiene el principio activo Apixabán y pertenece a un grupo de medicamentos llamados anticoagulantes .Este medicamento ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre al bloquear el Factor Xa, un elemento importante de la coagulación de la sangre. **Segumax** se usa en adultos:
• para prevenir la formación de coágulos de sangre después de una operación de reemplazo de cadera o rodilla. Después de una operación de cadera o rodilla usted puede tener un mayor riesgo de que se le formen coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda [TVP]). Esto puede causar hinchazón en las piernas, con o sin dolor. Si un coágulo de sangre viaja de la pierna a sus pulmones, puede impedir el flujo de sangre, causando dificultad para respirar, con o sin dolor de pecho. Esta condición médica (embolismo pulmonar) puede suponer un riesgo para su vida y requiere atención médica inmediata.
• para prevenir la formación de un coágulo sanguíneo en el corazón en pacientes con un latido irregular del corazón (fibrilación auricular) y al menos un factor de riesgo adicional. Los coágulos sanguíneos se pueden desprender, moverse hasta el cerebro y provocar un accidente cerebrovascular, o moverse a otros órganos evitando una correcta irrigación del mismo (también conocida como embolia sistémica). Un accidente cerebrovascular puede tener riesgo para la vida y requiere atención médica inmediata.
• para tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas (trombosis venosa profunda) y en los vasos sanguíneos de los pulmones (embolia pulmonar), y para prevenir que estos coágulos de sangre vuelvan a aparecer en los vasos sanguíneos de las piernas y/o de los pulmones.

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR SEGUMAX

No tome Segumax si: • es alérgico a Apixabán o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. • sangra excesivamente o más de lo esperado; • tiene una enfermedad en un órgano del cuerpo que aumenta el riesgo de sangrado grave (como una úlcera activa o reciente del estómago o intestino, o hemorragia cerebral reciente); • padece una enfermedad del hígado que aumenta el riesgo de sangrado (coagulopatía hepática) • está tomando medicamentos para prevenir la coagulación de la sangre (por ejemplo, warfarina, acenocumarol, rivaroxabán, dabigatrán o heparina), excepto cuando cambie de tratamiento anticoagulante, mientras tenga una vía arterial o venosa y sea tratado con heparina para mantener esa vía abierta, o al recibir heparina cuando se le inserte un tubo en un vaso sanguíneo (ablación por catéter) para tratar un ritmo cardíaco irregular (arritmia).
Tenga especial cuidado con Apixabán. Si sabe que padece una enfermedad denominada síndrome antifosfolípido (un trastorno del sistema inmunitario que aumenta el riesgo de que se formen coágulos de sangre), informe a su médico para que decida si puede ser necesario modificar el tratamiento. Apixabán debe usarse con precaución si usted presenta alguna condición que tenga un riesgo mayor de hemorragia. En caso de presentar hemorragia debe suspender el tratamiento y comunicarse inmediatamente con su médico. Informe a su médico antes de tomar este medicamento si presenta alguna de estas condiciones: • un riesgo aumentado de sangrado, como, por ejemplo, trastornos hemorrágicos, incluyendo situaciones que resulten en una disminución de la actividad de las plaquetas (células de la sangre encargadas de la coagulación), presión arterial muy alta no controlada por tratamiento médico, si usted es mayor de 75 años; si usted pesa 60 kg o menos; • una enfermedad renal grave o si está sometido a diálisis; • un problema de hígado o historial de problemas de hígado. este medicamento se utilizará con precaución en pacientes con señales de afectación en la función del hígado; • tuvo un catéter o recibió una inyección en la columna vertebral (para anestesia o alivio del dolor), su médico le indicará que deje pasar un mínimo de 5 horas después de retirar el catéter antes de tomar este medicamento; • tiene colocada una prótesis en alguna de las válvulas del corazón; • si su médico determina que su presión arterial es inestable o tiene previsto recibir otro tratamiento o ser sometido a una cirugía para extraer el coágulo de sangre de sus pulmones. Es necesario que antes de realizarse cualquier cirugía o procedimiento médico u odontológico usted informe a otros médicos, odontólogos o cualquier personal de salud que está tomando **Segumax**. Si necesita una intervención quirúrgica o un procedimiento que pueda provocar un sangrado, su médico le indicará suspender temporalmente la toma de este medicamento durante un tiempo. Si no está seguro de si una intervención puede provocar un sangrado, consulte a su médico. Las inyecciones intramusculares (aplicadas en glúteo, hombro o muslo) pueden causar la aparición de hematomas en el sitio de inyección en pacientes que reciben tratamiento con Apixabán, por lo cual debe advertir previamente que está recibiendo este medicamento y evitar este tipo de inyecciones. Las inyecciones subcutáneas (justo debajo de la piel) e intravenosas, por su parte, no conducen a este tipo de complicaciones. Aún no existe antídoto para Apixabán, por lo cual es necesario que su médico evalúe continuamente el tratamiento, así como la necesidad de ajustar o interrumpir el mismo en determinadas situaciones como, por ejemplo, aparición de sangrados u otro efecto adverso, realización de cirugías, ajuste de dosis por cambios en el funcionamiento de sus riñones, posibles cambios en el efecto de Apixabán debido al uso de otros medicamentos, necesidad de cambiar el tipo de anticoagulante.
Uso en niños y adolescentes. No se recomienda el uso de este medicamento en niños y adolescentes de menos de 18 años de edad.
Uso de Segumax con otros medicamentos. Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta, suplementos dietarios o derivados de hierbas, ya que puede ser necesario interrumpir el tratamiento o ajustar la dosis de alguno de ellos. Algunos medicamentos pueden aumentar los efectos de **Segumax** y algunos medicamentos pueden disminuir sus efectos. Su médico decidirá si debe ser tratado con **Segumax** si está tomando estos medicamentos y si debe mantenerse bajo observación más estrecha. Los siguientes medicamentos pueden aumentar los efectos de **Segumax** e incrementar la posibilidad de una hemorragia no deseada: • algunos medicamentos para las infecciones causadas por hongos (por ejemplo, ketoconazol, itraconazol, voriconazol); • algunos medicamentos antivirales para el virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) o el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), (por ejemplo, ritonavir); • otros medicamentos para reducir la coagulación de la sangre (por ejemplo, enoxaparina) • antiinflamatorios o medicamentos para aliviar el dolor (por ejemplo, ácido acetilsalicílico o naproxeno). En especial si es usted mayor de 75 años y toma ácido acetilsalicílico, existe una mayor probabilidad de sufrir sangrado. • medicamentos para la presión arterial alta o problemas de corazón (por ejemplo, diltiazem); • medicamentos para tratar la depresión pertenecientes a los llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina .Los siguientes medicamentos pueden reducir la capacidad de **Segumax** de prevenir la formación de coágulos de sangre
• medicamentos para el tratamiento de la epilepsia o convulsiones (por ejemplo, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital) • Hierba de San Juan (hipérico, un medicamento a base de plantas para el tratamiento de la depresión) • medicamentos para tratar la tuberculosis u otras infecciones (por ejemplo, rifampicina).
Embarazo y lactancia. Si está embarazada o en período de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. Se desconocen los efectos de Apixabán sobre el embarazo y el feto. No debe tomar este medicamento si está embarazada. Informe inmediatamente a su médico si se queda embarazada mientras toma este medicamento. Se desconoce si Apixabán se excreta en la leche humana. Pregunte a su médico antes de tomar este medicamento durante la lactancia. Ellos le indicarán si interrumpir la lactancia o si dejar de tomar o no empezar a tomar este medicamento.
Información importante sobre los componentes de Segumax. Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar **Segumax.**
Efectos sobre la capacidad para conducir y emplear maquinarias. No se espera que **Segumax** interfiera con su capacidad para conducir o utilizar maquinarias.

3. COMO USAR SEGUMAX

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico.
Que dosis tomar
• ***Para prevenir la formación de coágulos de sangre en operaciones de sustitución de cadera o rodilla.*** La dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 2,5** dos veces al día, por ejemplo, un Comprimido Recubierto por la mañana y otro por la noche. Debe tomar el primer Comprimido Recubierto entre 12 a 24 horas después de la operación. Si se ha sometido a una cirugía mayor de cadera, generalmente tomará **Segumax 2,5** durante un período de 32 a 38 días. Si se ha sometido a una cirugía mayor de rodilla, generalmente tomará **Segumax 2,5** durante un período de 10 a 14 días.
• ***Para prevenir la formación de un coágulo de sangre en el corazón de los pacientes con un latido irregular del corazón y al menos un factor de riesgo adicional.*** La dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 5** dos veces al día; por ejemplo, un Comprimido Recubierto por la mañana y otro por la noche. La dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 2,5** dos veces al día, por ejemplo, un Comprimido Recubierto por la mañana y otro por la noche si:
• tiene la función renal gravemente disminuida; • presenta dos o más de los siguientes factores: - los resultados de los análisis de sangre sugieren un pobre funcionamiento del riñón (cuando el valor de creatinina sérica es igual o mayor de 1,5 mg/dl). - tiene una edad igual o superior a 80 años; - su peso es igual o inferior a 60 kg. Su médico le indicará durante cuánto tiempo debe continuar el tratamiento.
• ***Para prevenir que los coágulos de sangre vuelvan a producirse después de los pacientes con un latido irregular del corazón y al menos un factor de riesgo adicional.*** La dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 5** dos veces al día durante los primeros 7 días; por ejemplo, dos Comprimidos Recubiertos por la mañana y dos Comprimidos Recubiertos por la noche. Después de 7 días la dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 5** dos veces al día; por ejemplo, un Comprimido Recubierto por la mañana y otro por la noche.
• ***Para tratar los coágulos de sangre en las venas de las piernas y en los vasos sanguíneos de los pulmones.*** La dosis recomendada es de dos Comprimidos Recubiertos de **Segumax 5** dos veces al día durante los primeros 7 días; por ejemplo, dos Comprimidos Recubiertos por la mañana y dos Comprimidos Recubiertos por la noche. Después de 7 días la dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 5** dos veces al día; por ejemplo, un Comprimido Recubierto por la mañana y otro por la noche.
• ***Para prevenir que los coágulos de sangre vuelvan a producirse después de 6 meses de tratamiento.*** La dosis recomendada es de un Comprimido Recubierto de **Segumax 2,5** dos veces al día; por ejemplo, un Comprimido Recubierto por la mañana y otro por la noche. Su médico le indicará durante cuánto tiempo debe continuar el tratamiento.
Su médico puede cambiar su tratamiento anticoagulante tal como se indica a continuación:
- ***Cambio de Segumax a medicamentos anticoagulantes.*** Deje de tomar **Segumax**. Inicie el tratamiento con los medicamentos anticoagulantes (por ejemplo, heparina) en el momento que tenga que tomar el próximo comprimido.

TARJETA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE
Segumax 2,5 - 5
Comprimidos Recubiertos

Lleve siempre consigo esta tarjeta

Muestre esta tarjeta a todos los médicos, farmacéuticos o dentistas que lo traten.
Información para pacientes

- Tome **Segumax** de forma regular siguiendo las indicaciones. *Si olvidó una dosis, tómela en cuanto se acuerde y después siga tomando el medicamento como de costumbre.*
*No interrumpa el tratamiento con **Segumax** sin hablar primero con su médico, porque estaría en riesgo de sufrir un ACV u otras complicaciones.*
- **Segumax** ayuda a hacer su sangre más fluida. Sin embargo, esto puede aumentar el riesgo de sangrado.

• ***Cambio de medicamentos anticoagulantes a Segumax.*** Deje de recibir medicamentos anticoagulantes. Inicie el tratamiento con **Segumax** en el momento que tenga que recibir la próxima dosis de un medicamento anticoagulante y entonces continúe con normalidad.
• ***Cambio de un tratamiento con anticoagulantes que contiene antagonistas de la vitamina K (por ejemplo, acenocumarol o warfarina) a Segumax.*** Deje de tomar el medicamento que contiene un antagonista de la vitamina K. Su médico necesitará realizarle análisis de sangre e indicarle cuándo empezar a tomar **Segumax**.
• ***Cambio del tratamiento con Segumax a un tratamiento anticoagulante que contiene un antagonista de la vitamina K (por ejemplo, acenocumarol o warfarina).*** Si su médico le indica que debe empezar a tomar un medicamento que contiene un antagonista de la vitamina K, continúe tomando **Segumax** durante al menos 2 días después de su primera dosis del medicamento que contiene un antagonista de la vitamina K. Su médico necesitará realizarle análisis de sangre e indicarle cuándo dejar de tomar **Segumax**.
Pacientes sometidos a cardioversión. Si su latido cardiaco necesita ser recuperado mediante un proceso llamado cardioversión, tome este medicamento en los momentos que su médico le indique para prevenir coágulos de sangre en los vasos sanguíneos del cerebro y otros vasos sanguíneos del cuerpo.
Modo de administración
Los Comprimidos Recubiertos de **Segumax** deben tomarse con cantidad suficiente de líquido y pueden tomarse con o sin alimentos. Trate de ingerir los Comprimidos Recubiertos a la misma hora cada día para conseguir un mejor efecto del tratamiento.
Si tiene dificultad para tragar el Comprimido Recubierto entero, hable con su médico sobre otras posibles formas de tomar **Segumax**. El Comprimido Recubierto se puede triturar y mezclar con agua, dextrosa al 5% en agua, jugo de manzana o puré de manzana, inmediatamente antes de tomarlo.
Si fuera necesario, su médico también podrá indicarle administrar el Comprimido Recubierto de **Segumax** triturado y mezclado en 60 ml de agua o dextrosa al 5% en agua a través de una sonda nasogástrica.
Si toma más Segumax del que debe. Informe inmediatamente a su médico si ha tomado una dosis mayor que la dosis recetada de este medicamento.
Si toma más **Segumax** que la dosis recomendada, puede aumentar el riesgo de sangrado. Si ocurre una hemorragia, pueden ser necesarias una cirugía o transfusiones de sangre. No hay antídoto contra Apixabán. Ante la eventualidad de haber tomado una dosis mayor a la que debiera de **Segumax** contacte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:
• *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247;*
• *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115;*
• *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*
Si olvidó tomar Segumax. Tome la dosis en cuanto se acuerde, tome la siguiente dosis de **Segumax** a la hora habitual y después, siga tomando el medicamento como de costumbre.
Si interrumpe el tratamiento con Segumax. No interrumpa el tratamiento con este medicamento sin hablar primero con su médico, porque el riesgo de desarrollar un coágulo de sangre puede ser mayor si las interrumpe el tratamiento. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, **Segumax** puede tener efectos adversos, aunque sólo algunas personas los padecen.
Segumax puede administrarse en tres enfermedades distintas. Los efectos adversos conocidos y la frecuencia con que se producen pueden ser distintos y por tanto se indican por separado a continuación. Para esas condiciones, el efecto adverso más frecuente de este medicamento es el sangrado, que puede poner en peligro la vida del paciente y requiere atención médica inmediata.
Los siguientes efectos adversos se han notificado cuando se toma Segumax en la prevención de la formación de coágulos sanguíneos en las operaciones de reemplazo de cadera o rodilla. ***Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):*** • Anemia, que puede causar cansancio o palidez; Sangrados que incluye: hematomas e hinchazón; • Náuseas. ***Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):*** • Disminución del número de plaquetas en sangre (que puede afectar la coagulación); • Sangrados: del estómago, del intestino o sangre roja brillante en las heces, sangre en la orina, por la nariz, por la vagina, sangrado posterior a una operación incluyendo hematoma e hinchazón, secreción de sangre o líquido procedente de la herida / incisión quirúrgica (supuración) o del sitio de una inyección. • Presión arterial baja que puede producir desvanecimiento o latido de corazón más rápido; • Los análisis de sangre pueden mostrar: función anormal del hígado; aumento de algunas enzimas del hígado; aumento de la bilirrubina, un producto derivado de los glóbulos rojos de la sangre, que puede causar coloración amarilla de la piel y los ojos; • Picazón. ***Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):*** • Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) que puede producir: hinchazón de la cara, labios, boca, lengua y/o garganta, y dificultad para respirar. Informe a su médico inmediatamente si sufre cualquiera de estos síntomas. ***Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10000 personas):*** • Sangrados: en el cerebro o la médula espinal, en los pulmones o la garganta, en la boca, en el abdomen o el espacio detrás de la cavidad abdominal, de hemorroides; estudios que muestran sangre en las heces o en la orina; • Erupción cutánea que puede manifestarse como formación de ampollas y tener el aspecto de pequeñas manchas oscuras en el centro, rodeadas de un área más clara, con un anillo oscuro alrededor del borde (eritema multiforme). • Inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) que puede causar erupción cutánea, aparición de puntos rojos redondos y lisos bajo la superficie de la piel o hematomas. **Los siguientes efectos adversos se han notificado cuando se toma Apixaban para prevenir la formación de coágulos sanguíneos en el corazón en pacientes con latido irregular del corazón y al menos un factor de riesgo adicional.** ***Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):*** • Sangrados: en los ojos, en el estómago o intestino o sangre oscura / negra en las heces, por el recto, de la nariz, de las encías, hematomas e hinchazón, sangre en la orina; • Anemia, que puede causar cansancio o palidez; • Presión arterial baja que puede producir desvanecimiento o latido de corazón más rápido; • Náuseas; • Los análisis de sangre pueden mostrar un aumento en la gamma glutamil transpeptidasa (GGT). ***Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):*** • Sangrados: en el cerebro o la médula espinal, en la boca, y los y expectoración con sangre, en el abdomen, por la vagina, sangre brillante / roja en las heces, sangrado posterior a una operación que incluye hematomas e hinchazón, secreción de sangre o líquido procedente de la herida / incisión quirúrgica (supuración) o en el sitio de una inyección, de hemorroides, estudios que muestran sangre en las heces o en la orina; • Disminución del número de plaquetas en sangre (que puede afectar la coagulación); • Los análisis de sangre pueden mostrar: función anormal del hígado, aumento de algunas enzimas del hígado, aumento de la bilirrubina, un producto derivado de los glóbulos rojos de la sangre, que puede causar coloración amarilla de la piel y los ojos; • Erupción en la piel; • Picazón; • Caída del cabello; • Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) que puede producir: hinchazón de la cara, labios, boca, lengua y / o garganta, y dificultad para respirar. Informe a su médico inmediatamente si sufre cualquiera de estos síntomas. ***Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):*** • Sangrados: en los pulmones o la garganta, dentro del espacio que se ubica detrás de la cavidad abdominal, en un músculo. ***Efectos adversos muy raros (pueden afectar hasta 1 de cada 10000 personas):*** • Erupción cutánea que puede manifestarse como formación de ampollas y tener el aspecto de pequeñas manchas oscuras en el centro, rodeadas de un área más clara, con un anillo oscuro alrededor del borde (eritema multiforme). ***Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):*** • Inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) que puede causar erupción cutánea, aparición de puntos rojos redondos y lisos bajo la superficie de la piel o hematomas. **Los siguientes efectos adversos se han comunicado cuando se toma Apixaban para tratar o prevenir que los coágulos de sangre vuelvan a producirse en las venas de las piernas y en los vasos sanguíneos de los pulmones.** ***Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas):*** • Sangrados: de la nariz, de las encías, del estómago, del intestino o del recto, en la boca, de la vagina, sangre en la orina, hematomas e hinchazón. • Anemia, que puede causar cansancio o palidez; •Disminución del número de plaquetas en sangre (que puede afectar la coagulación); • Náuseas; • Erupción en la piel; • Los análisis de sangre pueden mostrar: un aumento en la gamma glutamil transpeptidasa (GGT) o alanina aminotransferasa (TGP). ***Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):*** • Presión arterial baja que puede producir desvanecimiento o latido de corazón más rápido; • Sangrados: en los ojos, en la boca, los y expectoración con sangre,sangre brillante / roja en las heces, estudios que muestran sangre en las heces o en la orina, sangrado posterior a una operación, que incluye hematoma e hinchazón, secreción de sangre o líquido procedente de la herida / incisión quirúrgica (supuración) o en el sitio de una inyección, de hemorroides, en un músculo; • Picazon; • Caída del cabello; • Reacciones alérgicas (hipersensibilidad) que pueden producir: hinchazón de la cara, labios, boca, lengua y/o garganta, y dificultad para respirar. Contacte con su médico inmediatamente si sufre cualquiera de estos síntomas. • Los análisis de sangre pueden mostrar: función anormal del hígado, aumento de algunas enzimas del hígado, aumento de la bilirrubina, un producto derivado de los glóbulos rojos de la sangre, que puede causar coloración amarilla de la piel y los ojos. ***Efectos adversos raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas):*** • Sangrados: en el cerebro o la médula espinal, en los pulmones. ***Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):*** • Sangrados: en el abdomen o el espacio detrás de la cavidad abdominal. • Erupción cutánea que puede manifestarse como formación de ampollas y tener el aspecto de pequeñas manchas oscuras en el centro, rodeadas de un área más clara, con un anillo oscuro alrededor del borde (eritema multiforme). • Inflamación de los vasos sanguíneos (vasculitis) que puede causar erupción cutánea, aparición de puntos rojos redondos y lisos bajo la superficie de la piel o hematomas.

5. CONSERVACIÓN DE SEGUMAX

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.
No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

El principio activo de **Segumax** es Apixabán.
Segumax 2,5: cada Comprimido Recubierto contiene: Apixabán 2,5 mg. Los demás componentes son: Celulosa Microcristalina; Laurilsulfato de Sodio; Carboximetilcelulosa Reticulada; Estearato de Magnesio; Lactosa; Rojo Óxido Férrico; Copolímero con Injerto de Polivinilalcohol-Polietilenglicol; Talco; Dióxido de Titanio; Ésteres de Mono y Diglicéridos de Ácidos Grasos; Alcohol Polivinílico.
Segumax 5: cada Comprimido Recubierto contiene: Apixabán 5 mg. Los demás componentes son: Celulosa Microcristalina; Laurilsulfato de Sodio; Carboximetilcelulosa Reticulada; Estearato de Magnesio; Lactosa; Rojo Óxido Férrico; Copolímero con Injerto de Polivinilalcohol-Polietilenglicol; Talco; Dióxido de Titanio; Ésteres de Mono y Diglicéridos de Ácidos Grasos; Alcohol Polivinílico.
Aspecto del producto y contenido del envase
Segumax 2,5: Envase conteniendo 60 Comprimidos Recubiertos redondos, grabados con logo Bagó en una de sus caras, color rosa claro.
Segumax 5: Envase conteniendo 60 Comprimidos Recubiertos redondos, grabados con logo Bagó en una de sus caras, color rosa claro.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **SEGUMAX** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Esta especialidad medicinal se encuentra incluida dentro de un Plan de Gestión de Riesgo (Plan especial de Farmacovigilancia para garantizar el uso adecuado y seguro del producto).
Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / infoproducto@bago.com.ar.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 60.096.
Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 2331/24.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia o llamar a A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

Bagó
Ética al servicio de la salud

5505003

LABORATORIOS BAGÓ S.A.
Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico. Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA), La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

Información para profesionales de la salud
Segumax *(Apixabán) es un anticoagulante oral que actúa por inhibición directa y selectiva del factor Xa*
Segumax *puede aumentar el riesgo de sangrado. En caso de eventos de sangrado mayor, debe interrumpirse el tratamiento inmediatamente.*
- El tratamiento con **Segumax** no requiere monitorización rutinaria de la exposición a Apixabán. Un ensayo cuantitativo sobre Factor Xa calibrado puede ser útil en *situaciones excepcionales, por ejemplo, sobredosis o cirugía de emergencia (no se recomiendan los ensayos de tiempo de protrombina (TP), Razón Internacional Normalizada (RIN) y tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) - Ver prospectos.*
- *Los síntomas y señales de sangrado incluyen hematomas o sangrado bajo la piel, heces de color negruzco, sangre en la orina, sangrado por la nariz, aturdimiento, cansancio, palidez o debilidad, dolor de cabeza repentino, los con sangre o vómitos de sangre.*
- *En caso de presentar un sangrado que no cese por sí mismo, busque atención médica de forma inmediata.*
- Si necesita someterse a una cirugía u otro procedimiento invasivo, informe a su médico que está tomando **Segumax.**
Estoy recibiendo tratamiento con ***Segumax*** *(Apixabán) para prevenir los coagulos sanguineos.*
Por favor complete esta sección o pídale a su médico que la complete

Nombre: **Fecha de nacimiento:**
Indicación: **Dosis: _____mg dos veces por día**
Nombre del médico: **Número de teléfono del médico:**