

Bagóvit A plus

TRIAMCINOLONA ACETONIDA 0,1 %
VITAMINA A 100.000 U

Crema

Industria Argentina
EXPENDIO BAJO RECETA

FÓRMULA

Cada 100 g contiene: Triamcinolona Acetonida 100 mg; Vitamina A (como Palmitato) 100.000 U. Excipientes: Edetato Sódico; Butilhidroxitolueno; Metilparabeno; Propilparabeno; Polisorbato 80; Alcohol Cetílico; Alcohol Estearílico; Lauriletoxosulfato de Sodio; Vaselina; Glicerina; Lanolina; Citrato de Sodio; Ácido Cítrico; Perfume; Agua Purificada.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiinflamatorio. Antialérgico. Antiprurítico. Dermotrófico.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN – MODO DE ADMINISTRACIÓN

La dosis se adaptará al criterio médico y al cuadro clínico del paciente. Como esquema de orientación se aconseja:

Aplicar la crema sobre la zona lesionada haciendo un suave masaje para asegurar su mejor penetración, de 1 a 3 veces por día.

En lesiones crónicas o muy liquenificadas, puede ser útil la técnica del vendaje oclusivo:

- Extender la crema sobre la lesión.
- Cubrir con un vendaje de gasa.
- Recubrir con polietileno u otro material flexible e impermeable, fijando sus bordes en zonas de piel sana.
- Mantener 24-48 horas y repetir según sea necesario.

CONTRAINDICACIONES

Lesiones tuberculosas o virósicas cutáneas.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Dado que los corticoides se absorben por vía cutánea, cuando durante tiempo prolongado se traten lesiones muy extensas o se utilice vendaje oclusivo, deben tomarse las precauciones habituales para evitar fenómenos de hipercorticismos. En caso de existir infección secundaria bacteriana o micótica, debe complementarse con la terapéutica específica.

En caso de aparición de reacciones en la zona de la piel tratada, como irritación o dermatitis por hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la formulación, se debe suspender la aplicación del producto e instaurar el tratamiento adecuado de ser necesario.

No está demostrada la total inocuidad del uso de corticoides durante el embarazo, por lo que debe evitarse la aplicación sobre superficies corporales amplias durante ese período.

Interacciones

No descriptas para el uso tópico.

REACCIONES ADVERSAS

El medicamento es en general bien tolerado y a las dosis aconsejadas no provoca efectos colaterales ni secundarios.

Con la administración de corticoides bajo vendaje oclusivo o en zonas intertriginosas, se ha descripto la presentación de foliculitis, piodermis o atrofia localizada de la piel.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS

A las dosis terapéuticas recomendadas, no presenta.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación, consultar con urgencia al médico o comunicarse con un Centro de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN: Envase conteniendo 100 g de Crema.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓVIT A PLUS** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado Nro. 15.456.
Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 2298/94.

Bagó

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4344-2000/19. Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.
Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.