



Flebotropin 300

Flavonoides extraídos de las rutáceas

Comprimidos Recubiertos

Industria Argentina

EXPENDIO BAJO RECETA

FÓRMULA: cada Comprimido Recubierto contiene: Flavonoides extraídos de las rutáceas 750 mg (equivalentes a 300 mg de Diosmina). Excipientes: Povidona; Laurilsulfato de Sodio; Glicerina; Carboximetilcelulosa Reticulada; Estearato de Magnesio; Almidón de Maíz; Lactosa; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Verde S; Triacetina; Maltodextrina c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: **Flebotónico. Capilaroprotector.**

INDICACIONES

Estados varicosos y prevaricosos, insuficiencia venosa crónica, edema de origen linfático o venoso, síndrome de piernas pesadas, insuficiencia venosa del embarazo, síndrome posflebítico, hemorroides, crisis hemorroidal. Fragilidad capilar: hemorragias conjuntivales y retinianas, gingivorragias, petequias, equimosis y hematomas espontáneos.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

Acción Farmacológica: Ejerce acción venotónica y vasculoprotectora, a través de un efecto venoconstrictor, un aumento de la resistencia de los vasos y una disminución de su permeabilidad.

En estudios preclínicos, el producto ha mostrado una doble acción sobre el sistema venoso de retorno:

- a nivel de las venas y vénulas aumenta el tono parietal.
- a nivel de la microcirculación aumenta la resistencia capilar y normaliza la permeabilidad.

Estas propiedades han sido confirmadas en el hombre en estudios de farmacología clínica.

Farmacocinética: La absorción digestiva del producto es rápida. Los niveles séricos máximos se alcanzan a los 60-120 minutos.

La eliminación se produce principalmente por vía urinaria. El 40% de la dosis administrada se elimina con la orina de las primeras 24 horas bajo forma conjugada. El resto se elimina fundamentalmente por vía digestiva.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis se establecerá, según criterio médico y cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación, se aconseja:

2 comprimidos por día, repartidos en dos tomas.

En casos agudos (Por ejemplo: crisis hemorroidal) esta dosis puede ser incrementada sin inconvenientes hasta a 6 comprimidos diarios, repartidos en 2 ó 3 tomas.

CONTRAINDICACIONES

No se conocen hasta el presente.



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: *Embarazo:* Como todo nuevo medicamento, no se recomienda la administración de **Flebotropin 300** a mujeres gestantes durante el primer trimestre del embarazo, hasta tanto sea demostrada su total inocuidad sobre tal estado. Sin embargo una vez transcurrido dicho período, el producto está especialmente indicado para el tratamiento de los síndromes venosos que habitualmente acompañan al embarazo.

Lactancia: No se conoce hasta el presente si el producto se elimina con la leche materna. Por dicha razón no se aconseja su utilización durante la lactancia.

Interacciones: No se han detectado hasta el presente.

REACCIONES ADVERSAS

Sólo se han registrado algunos casos (menos del 1%) de trastornos digestivos leves. En ningún momento los efectos adversos obligaron a la suspensión del tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN

Hasta el presente no se han reportado casos de sobredosis no tratada. Ante la eventualidad de una sobredosificación o ingestión accidental, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247;
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna): Tel.: (011) 4300-2115;
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/658-7777.

PRESENTACIÓN: Envases conteniendo 20 y 40 Comprimidos Recubiertos.

Conservar al abrigo del calor (no mayor de 30 °C) y de la humedad excesiva.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **FLEBOTROPIN 300** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 35.204.

"La consulta médica regular es uno de los pilares de la Medicina Preventiva. Consulte periódicamente a su médico".



Laboratorios Bagó S.A.

Investigación y Tecnología Argentina

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.