

Bagó B1-B6-B12 10.000

Vitamina B1 100 mg

Vitamina B6 200 mg

Vitamina B12 10 mg

Inyectable

Industria Argentina

EXPENDIO BAJO RECETA

FÓRMULA

Cada frasco-ampolla contiene: Tiamina Clorhidrato (Vit. B1) 100 mg; Piridoxina Clorhidrato (Vit. B6) 200 mg; Hidroxocobalamina (como Hidroxocobalamina Sulfato) (Vit. B12) 10 mg.

Cada ampolla contiene: Lidocaína Clorhidrato 20 mg. Excipientes: Citrato de Sodio; Ácido Cítrico; Polietilenglicol; Alcohol; Agua para Inyectables c.s.p. 2,5 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Vitamínico. Antianémico. Neurotrófico. Antiálgico.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN – MODO DE ADMINISTRACIÓN

La dosis varía de acuerdo con el criterio médico y el cuadro clínico del paciente. Como posología media de orientación, se aconseja:

1-2 frascos-ampolla por día,
por vía intramuscular profunda exclusivamente.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de alergia a la Tiamina, Lidocaína o a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

A las dosis terapéuticas, no presenta.

ANTAGONISMOS Y ANTIDOTISMOS

A las dosis aconsejadas, no se han descripto.

INTERACCIONES

Tiamina (Vitamina B1): la tiosemicarbazona y el 5-fluoruracilo anulan su acción. Los antiácidos inhiben su absorción.

Piridoxina (Vitamina B6): administrada simultáneamente con medicamentos que contengan levodopa, acelera la metabolización de esta última, inhibiendo su efecto.

REACCIONES ADVERSAS

A las dosis recomendadas, el medicamento es bien tolerado y no se producen efectos colaterales o secundarios. No se han descripto para sus principios activos, signos de hipervitaminosis luego de utilización por largo tiempo de dosis elevadas.

Solamente en personas hipersusceptibles, la administración de Tiamina (Vitamina B1) por vía intravenosa y eventualmente por vía intramuscular, puede llegar a provocar reacciones anafilactoides que obliguen a suprimir el tratamiento.

SOBREDOSIFICACIÓN

En caso de intoxicación, consultar con urgencia al médico o comunicarse con un Centro de Toxicología:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 3 ó 6 frascos-ampolla con polvo y 3 ó 6 ampollas con solvente.

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **BAGÓ B1-B6-B12 10.000** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.

Certificado Nro. 33.230.

Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro. 1954/94.

Una tonalidad no uniforme del sólido contenido en el frasco-ampolla puede manifestarse debido a migración de vitamina B12 durante el proceso de liofilización, llegando a concentrar parte de la misma en el centro de la superficie de la pastilla.
Esto no altera en absoluto la acción terapéutica del producto.

Bagó

Ética al servicio de la salud

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.