

PROSPECTO PARA EL USUARIO

Ulcozol 10-20 **Omeprazol 10-20 mg** **Comprimidos Recubiertos Gastrorresistentes** **Vía de administración oral**

Industria Argentina
VL Venta Libre



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE ULCOZOL ?

Cada Comprimido Recubierto Gastrorresistente de **Ulcozol 10** contiene: Omeprazol: 10 mg.
Los demás componentes son: Lactosa; Laurilsulfato de sodio; Povidona; Povidona reticulada; Anhídrido silícico coloidal ; L-Arginina; Estearato de magnesio; Celulosa microcristalina; Hipromelosa; Triacetina; Talco; Copolímero de acrilato de etilo y Acido metacrílico; Dióxido de titanio; Anhídrido silícico coloidal; Bicarbonato de sodio; Laurilsulfato de sodio; Polietilenglicol 6000; Simeticona DCQ7-2243 LVA, Amarillo Óxido Férrico.

Cada Comprimido Recubierto Gastrorresistente de **Ulcozol 20** contiene: Omeprazol: 20 mg.
Los demás componentes son: Lactosa; Laurilsulfato de sodio; Povidona; Povidona reticulada; Anhídrido silícico coloidal ; L-Arginina; Estearato de magnesio; Celulosa microcristalina; Hipromelosa; Triacetina; Talco; Copolímero de acrilato de etilo y Acido metacrílico; Dióxido de titanio; Anhídrido silícico coloidal; Bicarbonato de sodio; Laurilsulfato de sodio; Polietilenglicol 6000; Simeticona DCQ7-2243 LVA.

Este Medicamento es Libre de Gluten

ACCIÓN

Reduce la producción de ácido estomacal.

¿PARA QUÉ SE USA ULCOZOL?

IF-2024-109115451-APN-DERM#ANMAT
RE-2024-84509908-APN-DTD#JGM



Ulcozol se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ULCOZOL?

NO USE este medicamento si usted:

- es alérgico al Omeprazol o a alguno de los principios inactivos de los comprimidos recubiertos gastroresistentes.
- es menor de 18 años de edad.
- No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez.
- No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones
- tiene diarrea prolongada o que no mejora
- acidez desde hace más de tres meses;
- acidez con mareos o transpiración;
- dolor de pecho frecuente y hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello,
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- pérdida de peso inexplicable;
- dolor de estómago, náuseas o vómitos;
- trastornos renales y/o hepático.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, gases, insomnio, somnolencia y sensación de hormigueo, trastornos renales.

Si aparece erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante)
- Digoxina (medicamento para el corazón)
- Teofilina (medicamento broncodilatador)
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamentos para la infección VIH-SIDA)
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Omeprazol.

IF-2024-109115451-APN-DERM#ANMAT
RE-2024-84509908-APN-DTD#JGM

Bagó

Ética al servicio de la salud

Consulte con su médico acerca de cualquier síntoma que le impresione relacionado con el uso de este producto y no se haya mencionado.
No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración.
Ulcozol no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Ulcozol es de administración únicamente por vía oral.

Adultos y mayores de 18 años:

- tomar un comprimido recubierto gastrorresistente de **Ulcozol** con un vaso de agua antes de desayunar por la mañana, todos los días durante 14 días.
- no exceda la dosis de un comprimido recubierto gastrorresistente por día sin consultar a su médico.
- no debe romper o masticar los comprimidos recubiertos gastrorresistentes .
- no tome **Ulcozol** por más de 14 días sin consultar a su médico.

Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico

No se debe tomar omeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología por ejemplo:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

PRESENTACIONES

Ulcozol 10-20: Envases conteniendo 7, 14 y 15 Comprimidos Recubiertos Gastrorresistentes. Presentaciones en Dispenser: envases conteniendo 28, 30 y 70 Comprimidos Recubiertos Gastrorresistentes.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

www.consumomasivo.bago.com.ar

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

IF-2024-109115451-APN-DERM#ANMAT
RE-2024-84509908-APN-DTD#JGM

Bagó

Ética al servicio de la salud

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 39.023.
Prospecto autorizado por ANMAT Disp. Nro.



LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.

IF-2024-109115451-APN-DERM#ANMAT
RE-2024-84509908-APN-DTD#JGM

